

Infection sexuelle transmise

Soumis par ATSR

13-12-2008

Dernière mise à jour : 19-01-2009

Le Sida : Signifie : Syndrome d'Immuno Déficience Acquise.

Syndrome = Ensemble des signes qui caractérisent une maladie.

Immuno Déficience = Destruction du système de défense immunitaire de l'organisme.

Acquise = non congénitale

Le SIDA est causée par un virus appelé V.I.H = (Virus de l'Immuno - Déficience Humaine.)

La chlamydie : c'est une blennorragie dont le germe responsable est la "chlamydie".

Elle se manifeste par une urérite plus modérée que la gonococcie, mais persistante: (qui dure longtemps et qui ne cède pas facilement au traitement). La syphilis: (vulgairement appelée vérole, ou mal napolitain) est une maladie vénérienne, infectieuse et contagieuse, due au tréponème pâle. Elle se manifeste par un chancre initial et par des atteintes viscérales et nerveuses tardives, certaines manifestations survenant plusieurs années après.

Les hépatites : sont des maladies très contagieuses causées par des virus .

Elles se transmettent d'une personne à une autre lors de rapports sexuels non protégés.

La transmission sanguine est également très fréquente.

Le virus attaque généralement le foie, seuls la vaccination, la prévention et le dépistage précoce sont les meilleures armes pour lutter contre ces maladies.

La blennorragie

Chez l'homme La manifestation la plus commune en est l'infection de l'urètre masculin, ou urétérite masculine purulente aiguë. L'incubation silencieuse dure deux à six jours, après le rapport contaminant. Ensuite apparaît une sensation de démangeaison légère au niveau de l'urètre. Très rapidement, un écoulement de pus va se manifester par le méat (orifice à l'extrémité de la verge).